




Village : Le Chenois (Grand-Rosière-Hottomont)

Vallée : ruisseau de Jauchelette
 Identification : RAM/01

Situation au plan de secteur : agricole et forestière

Commentaires : exploitation sylvicole. Site de grand intérêt pour la faune. Menace de remblai !!



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Important complexe de milieux humides le long du ruisseau de Jauchelette de part et d'autre de la N243. Cette zone est caractérisée par une grande diversité de couverts de grand intérêt : franges rivulaires, cariçaies, roselières, aulnaises, saulaies, peupleraies, friche (coupe à blanc), ... La végétation présente est de type humide : carex, populages, joncs, reines des prés, massettes, baldingères, saules, aulnes, frênes, peupliers ...






Villages : entre Autre-Eglise et Folx-les-Caves (Orp-Jauche)

Vallée : confluence des ruisseaux de Frambais et de la Petite Gette

Identification : RAM/02

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : la prairie et l'aulnaie sont paturées




Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Terrain inondable caractérisé par une succession de milieux humides (divers boisements humides et portion de prairie humide) au niveau de sources. La strate herbacée est composée d'espèces typiques telles des carex, joncs, iris, reines des prés, véroniques des marais.





Villages : entre Hottomont et Geest-Gérompont-Petit-Rosière

Vallée : ruisseau de Rosière
Identification : RAM/03

Situation au plan de secteur : agricole et forestière

Commentaires : exploitation sylvicole (peupleraies). L'étang peut constituer un refuge idéal pour les oiseaux et l'herpétofaune.



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Fond humide de grand intérêt biologique depuis la source du ruisseau de Rosière jusqu'en aval de la ferme d'Aubremé. Différents boisements (peupleraie et saulaie) et prairies humides se succèdent. La végétation herbacée est formée de carex, iris, populages, roseaux, massettes, joncs, baldingères, ... Les prairies présentent une végétation de haute valeur biologique.






Village : Grand-Rosière-Hottomont

Vallée : ruisseau de Waulsort
 Identification : RAM/04

Situation au plan de secteur : agricole

Commentaires : exploitation sylvicole. Contact avec le garde forestier (M. Goffin)




Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Cariçaie plantée de jeunes peupliers, frênes et chênes, le long du ruisseau de Waulsort. Végétation de bas-marais (carex et reines des prés).






Village : Fôdia (Offus), en aval de la ferme du Wayaux

Vallée : ruisseau de Quivelette
 Identification : RAM/05

Situation au plan de secteur : agricole et forestière

Commentaires : (fin d') exploitation sylvicole. Contact avec le responsable DNF local (M. Hubert)




Fond de carte : Institut Géographique National

Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Mosaïque de milieux humides le long du ruisseau de Quivelette. La zone, en grande partie forestière (CPAS de Namur et propriétés privées), se prolonge par une prairie humide au nord de la ferme du Wayaux. Les différents milieux se succèdent au niveau de sources : aulnaie, roselière, ancienne peupleraie, ... La végétation herbacée est composée de carex, joncs, roseaux, massettes, populages, iris, reines des prés. Le site peut servir de refuge hivernal pour différentes espèces (bécasse par exemple).






Villages : entre Bomal et Glimes (Incourt)

Vallée : ruisseau de l'Heubais
 Identification : RAM/06

Situation au plan de secteur : agricole et espaces verts

Commentaires : la petite roselière en prairie est située en zone d'espaces verts (pâturage)




Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



L'Heubais longe différents milieux humides. Un boisement d'abord, composé d'une peupleraie et d'une aulnaie-saulaie avec une strate herbacée composée de patches de carex et de reines des prés. Ensuite, juste avant sa jonction avec la Grande Gette, il borde un petit marais en prairie, composé d'une végétation de roseaux, juncs et carex.






Village : Geest-gérompont-Petit-Rosière, en face du complexe communal

Vallée : rivière de la Grande Gette
Identification : RAM/07

Situation au plan de secteur : habitat à caractère rural



Fond de carte :
Institut Géographique National

Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide

Bas-marais (carex et baldingères) le long de la Grande Gette. Présence de saules.






Village : en amont du Tomboi

Vallée : rivière de la Grande Gette
 Identification : RAM/08

Situation au plan de secteur : forestière

Commentaires : exploitation sylvicole




Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide



Important boisement humide le long de la Grande Gette. Cette zone se caractérise par une mosaïque de milieux adjacents : peupleraie, saulaie, aulnaie et cariçaie humides, présentant souvent une végétation herbacée typique (carex parfois sous forme de touradons, roseaux, massettes, joncs...). Le peuplier est prédominant.






Village : Les Tainnières (Geest-Gérompont-Petit-Rosière)

Vallée : ruisseau de la Blanchisserie
 Identification : RAM/09

Situation au plan de secteur : agricole et forestière

Commentaires : en aval de la réserve naturelle provinciale "La Taisnière"




Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Etang et roselière au niveau des sources du ruisseau de la Blanchisserie. La frange rivulaire de l'étang est composée de massettes, carex et autres joncs ; la roselière est, quant à elle, composée de roseaux (de fait), de carex et de reine des prés, avec quelques arbres (frênes et aulnes).






Village : Grand- Warichet

Vallée : ruisseaux du Brou, de la fontaine qui
bout et Grande Gette
Identification : RAM/10

Situation au plan de secteur : habitat à caractère rural et forestière

Commentaires : exploitation sylvicole



Fond de carte :
Institut Géographique National

Végétation

-  Aulnaie humide
-  Autre
-  Cariçaie non boisée
-  Coupe à blanc humide
-  Divers bois humide
-  Frange rivulaire
-  Intérêt paysager
-  Peupleraie humide
-  Plan d'eau d'intérêt
-  Prairie humide
-  Roselière
-  Saulaie humide



Important complexe de milieux humides le long du ruisseau de Jauchelette de part et d'autre de la N243. Cette zone est caractérisée par une grande diversité de couverts de grand intérêt : franges rivulaires, cariçaies, roselières, aulnaies, saulaies, peupleraies, friche (coupe à blanc), ... La végétation présente est de type humide : carex, populages, joncs, reines des prés, massettes, baldingères, saules, aulnes, frênes, peupliers ...






Village : Fagneton

Vallée : ruisseau de Fagneton
 Identification : RAM/11

Situation au plan de secteur : agricole


Commentaires : envahissement partiel par les ronces



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide

Cariçaies et saulaie humide autour du point de résurgence du ruisseau de Fagneton.
 Végétation herbacée peu diversifiée et quelque peu envahie par les ronciers en périphérie de la cariçaie. Présence de cresson au niveau de la source. En plus de la saulaie, présence d'aulnes et de frênes.





Village : Huppaye

Vallée : ruisseau des Gotteaux
 Identification : RAM/12

Situation au plan de secteur : habitat à caractère rural et agricole

Commentaires : pâturage



Végétation

- Aulnaie humide
- Autre
- Cariçaie non boisée
- Coupe à blanc humide
- Divers bois humide
- Frange rivulaire
- Intérêt paysager
- Peupleraie humide
- Plan d'eau d'intérêt
- Prairie humide
- Roselière
- Saulaie humide



Bois et prairie humide le long du ruisseau des Gotteaux.
 Le boisement composé de plusieurs essences (aulnes, frênes, saules) est caractérisé par un sol très marécageux avec du populage. La proximité des habitations rend fragile ce milieu. En amont directement du bois, on trouve une petite surface de roselière entretenue. Un pré en aval est caractérisé par une végétation humide sur une partie de sa surface (carex, cardamines, joncs, ...).

